## О топологии ферми-поверхности со спонтанно нарушенной вращательной симметрией

С. С. Панкратов<sup>+\*1</sup>), М. Балдо<sup>×</sup>, М. В. Зверев<sup>+\*</sup>

+ Национальный исследовательский центр "Курчатовский Институт", 123182 Москва, Россия

\* Московский физико-технический институт, 141701 Долгопрудный, Россия

× Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Catania, I-95123 Catania, Italy

Поступила в редакцию 31 октября 2017 г.

На примере двумерной ферми-системы с квазичастичным взаимодействием  $f(\mathbf{p}, \mathbf{p}')$ , имеющим резкий максимум при  $|\mathbf{p}-\mathbf{p}'| = q_0$ , изучается взаимосвязь спонтанного нарушения вращательной симметрии системы и изменения топологии ее ферми-поверхности. Показано, что в случае притяжения и  $q_0 = 2p_{\rm F}$ первой неустойчивостью при усилении взаимодействия оказывается неустойчивость Померанчука в канале с L = 2, которая приводит к переходу второго рода в нематическую фазу. Монте-Карловскими расчетами найдено, что за этим переходом следует цепочка фазовых переходов первого и второго рода с изменением симметрии и топологии ферми-поверхности. В случае отталкивания и малых значений  $q_0$ первым происходит топологический переход в состояние со спонтанно нарушенной вращательной симметрией – рождение  $L \simeq \pi(p_{\rm F}/q_0 - 1)$  малых дырочных карманов на расстоянии  $p_{\rm F} - q_0$  от центра и деформация внешней ферми-поверхности с мультипольностью L. При  $q_0 \rightarrow 0$ , когда изучаемая модель переходит в двумерную модель Нозьера, мультипольность спонтанной деформации  $L \rightarrow \infty$ , и бесконечно складчатая ферми-линия приобретает хаусдорфову размерность  $\mathcal{D} = 2$ , что отвечает состоянию с фермионным конденсатом.

DOI: 10.7868/S0370274X17230060

1. В теории ферми-жидкости [1, 2] квазичастицы в однородной и изотропной системе заполняют в импульсном пространстве область, ограниченную вращательно симметричной ферми-поверхностью радиусом  $p_{\rm F}$ . Система квазичастиц с импульсным распределением  $n_{\rm FL}(\mathbf{p}) = \theta(p_{\rm F} - p)$  устойчива, пока любое его изменение  $\delta n(\mathbf{p})$  увеличивает энергию системы. Однако при сильном квазичастичном взаимодействии устойчивость ферми-жидкостного распределения  $n_{\rm FL}(\mathbf{p})$  может нарушаться. Один из сценариев такого нарушения, впервые рассмотренный Померанчуком [3], заключается в спонтанной деформации ферми-поверхности. Уменьшение энергии системы при анизотропном отклонении  $\delta n(\mathbf{p})$  от симметричного ферми-жидкостного распределения становится возможным при нарушении условий устойчивости Померанчука [3]. Возникающее в этом сценарии состояние со спонтанно нарушенной вращательной симметрией в современной литературе называется нематической фазой [4].

Другой сценарий нарушения устойчивости ферми-жидкостного распределения квазичастиц  $n_{\rm FL}(\mathbf{p})$  связан с изотропным спонтанным рождением

пар квазичастица-квазидырка, меняющим топологию ферми-поверхности, но не нарушающим ее вращательной симметрии. Топологический переход может менять связность ферми-поверхности [5–14] или ее топологическую размерность [15–17]. В результате перехода с изменением связности квазичастичный спектр системы становится немонотонной функцией импульса, неоднократно пересекающей химический потенциал. При переходе, в котором размерность ферми-поверхности становится равной размерность ферми-поверхности становится равной размерности системы, рождается область бездисперсионных квазичастиц – фермионный конденсат [15].

До сих пор в литературе два типа перестройки ферми-поверхности – с нарушением ее вращательной симметрии и с изменением ее топологии – рассматривались как альтернативные друг другу. В этой работе будет продолжен начатый в [18] самосогласованный анализ перестройки основного состояния системы за точкой ферми-жидкостной неустойчивости. Мы включим в рассмотрение оба типа перестроек и увидим, что они могут интерферировать, порождая весьма необычные формы ферми-поверхности.

**2.** Приступая к анализу взаимосвязи сценариев неустойчивости квазичастичной картины, напомним, что в теории ферми-жидкости энергия системы –

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>e-mail: capannelle@yandex.ru

функционал E[n] импульсного распределения квазичастиц  $n(\mathbf{p})$ , и вариация этого функционала связана с изменением  $\delta n(\mathbf{p})$  квазичастичного распределения интегральным соотношением

$$\delta E = \int \varepsilon(\mathbf{p}) \delta n(\mathbf{p}) \, dv, \qquad (1)$$

где dv обозначает деленный на  $(2\pi)^k$  элемент объема импульсного пространства k-мерной ферми-системы. В этом соотношении  $\varepsilon(\mathbf{p}) = \delta E/\delta n(\mathbf{p})$  – квазичастичный спектр, связанный с квазичастичным распределением формулой Ландау–Питаевского [1, 2, 19]

$$\frac{\partial \varepsilon(\mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\mathbf{p}}{m} + \int f(\mathbf{p}, \mathbf{p}_1) \, \frac{\partial n(\mathbf{p}_1)}{\partial \mathbf{p}_1} \, d\upsilon_1. \tag{2}$$

В соотношении (2) квазичастичное взаимодействие  $f(\mathbf{p}, \mathbf{p}_1)$ , строго говоря, само является функционалом  $n(\mathbf{p})$ , но в теории ферми-жидкости этой зависимостью пренебрегают, полагая взаимодейстие заданной функцией импульсов, или ограничиваются гармониками этой функции на ферми-поверхности. Если квазичастичное взаимодействие зависит только от относительного импульса  $\mathbf{p} - \mathbf{p}_1$ , то соотношение (2) интегрируется к виду

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} + \int f(\mathbf{p} - \mathbf{p}_1) \, n(\mathbf{p}_1) \, dv_1, \qquad (3)$$

который определяет форму функционала энергии

$$\frac{E[n]}{V} = \int \frac{p^2}{2m} n(\mathbf{p}) d\upsilon + \frac{1}{2} \int f(\mathbf{p} - \mathbf{p_1}) n(\mathbf{p}) n(\mathbf{p_1}) d\upsilon d\upsilon_1.$$
(4)

Мы рассмотрим модельную двумерную (2D) ферми-систему с квазичастичным взаимодействием

$$f(\mathbf{p} - \mathbf{p_1}) = \frac{\pi}{m} \frac{4\beta p_{\rm F}^2}{q_0^2} \frac{g}{[(\mathbf{p} - \mathbf{p_1})^2/q_0^2 - 1]^2 + \beta^2},$$
 (5)

имеющим максимум при  $|\mathbf{p} - \mathbf{p}_1| = q_0$ , ширина которого определяется параметром  $\beta$ . Выбор этого взаимодействия продиктован, с одной стороны, тем что с параметрами  $q_0 = 2p_{\rm F}$ ,  $\beta = 0.14$  и безразмерной константой связи g < 0 оно моделирует полученную в микроскопических расчетах [20, 21] функцию квазичастичного взаимодействия в 2D электронном газе при T = 0 вблизи квантовой критической точки, где расходится эффективная масса электронных квазичастиц [22–24]. С другой стороны, при  $q_0 \rightarrow 0$ ,  $\beta \rightarrow 0$  и g > 0 взаимодействие (5) принимает вид  $f(\mathbf{p} - \mathbf{p}_1) = (4\pi^3 p_{\rm F}^2/m)g\delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}_1)$ , т.е. модель переходит в модель Нозьера [17], в которой при сколь угодно малой константе g происходит фермионная конденсация. Ферми-жидкость остается устойчивой относительно спонтанной деформации ферми-поверхности с мультипольностью L, пока выполняется условие Померанчука [3] для гармоники  $f_L$ . В 2D-системе это условие имеет вид

$$1 + \frac{m^*}{\pi} \frac{f_L}{2} > 0, \tag{6}$$

где эффективная масса  $m^{*}$  выражается через первую гармонику:

$$\frac{m^*}{m} = \left(1 - \frac{m}{\pi} \frac{f_1}{2}\right)^{-1},\tag{7}$$

а сами *L*-гармоники вычисляются интегрированием взаимодействия как функции угла  $\vartheta$  между импульсами **р** и **р**<sub>1</sub>, лежащими на ферми-окружности, с  $\cos(L\vartheta)$ :

$$f_L = \int_{0}^{2\pi} f(\vartheta) \cos(L\theta) \frac{d\vartheta}{2\pi}.$$
 (8)

**3.** Для взаимодействия (5) с  $q_0 = 2p_F$ , моделирующего эффективное взаимодействие в 2D электронном газе в модели "желе", интеграл (8) принимает вид

$$f_L = \frac{\pi\beta g}{m} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(L\vartheta)}{[\sin^2(\vartheta/2) - 1]^2 + \beta^2} \frac{d\vartheta}{2\pi}.$$
 (9)

Поскольку знаменатель подынтегрального выражения имеет минимум при  $\vartheta = \pi$ , при g < 0 гармоники  $f_L$  с нечетным L положительны, а с четным Lотрицательны. При  $\beta \ll 1$  этот интеграл несложно оценить, перейдя к переменной  $x = (\vartheta - \pi)/2\sqrt{\beta}$  и преобразовав (9) к виду

$$f_L \simeq \frac{\pi}{m} \frac{g}{\sqrt{\beta}} \cos L\pi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - 2\beta L^2 x^2}{x^4 + 1 - 2\beta x^6/3} \frac{dx}{\pi}.$$
 (10)

Вычисляя интеграл в правой части (10), получаем

$$f_L \simeq \frac{\pi}{m} \frac{g}{\sqrt{2\beta}} (1 + \beta (1 - 4L^2)/2) \cos L\pi.$$
 (11)

Сохраненная рядом с единицей добавка  $\beta(1-4L^2)/2$ показывает, что гармоника  $f_2$  по модулю больше всех остальных четных гармоник (нулевая гармоника, отвечающая за сжимаемость системы, в нашем рассмотрении не участвует, поскольку электронный газ удерживается однородным положительно заряженным фоном). Пренебрегая для оценки этой добавкой при малых  $\beta$  и подставляя выражение (11) в (6) и (7), находим, что эффективная масса расходится при критической константе  $g_c^{(1)} \simeq -2\sqrt{2\beta}$ , в то время как устойчивость Померанчука в канале с L = 2, т.е. относительно квадрупольной деформации, нарушается при критической константе  $g_c^{(2)} \simeq -\sqrt{2\beta}$ , которая по модулю меньше, чем  $|g_c^{(1)}|$ .

Для анализа поведения гармоник  $f_L$  взаимодействия (5) с  $\beta = 0.14$  интеграл в (9) рассчитывался численно. На рис. 1 показана зависимость левой ча-



Рис. 1. (Цветной онлайн) Условия устойчивости Померанчука для  $1 \le L \le 4$ . При  $|g| \simeq 0.85$  первой теряется устойчивость в канале с L = 2

сти неравенства (6) в каналах с  $1 \le L \le 4$  от абсолютного значения отрицательной константы связи g. В случае L = 1 левая часть неравенства (6) совпадает с отношением  $m^*/m$ , и соответствующая кривая на рис. 1 показывает неограниченный рост эффективной массы при приближении |g| к критическому значению  $|g_c^{(1)}| \simeq 1.3$ . Однако при  $|g| = |g_c^{(2)}| \simeq 0.85$  система теряет устойчивость в канале с L = 2, т.е. ферми-линия приобретает квадрупольную деформацию.

Импульсное распределение  $n(\mathbf{p})$  квазичастиц в основном состоянии системы при  $|g| > |g_c^{(2)}|$  мы находили, минимизируя эффективный функционал энергии (4) с помощью метода Монте-Карло. В нашей задаче реализация этого метода заключается в следуюцем. Используется однородная сетка в 2D импульсном пространстве с шагом  $\Delta p$ , задаваемым условием  $V(\Delta p)^2/(2\pi)^2 = 1$ , в котором объем системы  $V = N/\rho$ , где N – полное число частиц. Состояние системы описывается квазичастичными числами заполнения  $n(\mathbf{p})$  на сетке, принимающими значения 1 и 0 для занятых и свободных состояний соответственно. Организуется случайное блуждание на множестве квазичастичных распределений в соответствии с гиббсовской термодинамически равновесной веро-

Письма в ЖЭТФ том 106 вып. 11-12 2017

ятностью  $\propto e^{-E[n]/T}$ . На каждом элементарном шаге процедуры предпринимается попытка перекладки квазичастицы из случайного занятого состояния в случайное пустое. Перекладка всегда принимается, если изменение энергии системы  $\Delta E < 0$ , в противном случае она принимается с вероятностью  $e^{-\Delta E/T}$ . В случае  $T \to 0$ , который мы будем обсуждать дальше, такая процедура эквивалентна минимизации эффективного функционала энергии. В расчетах, результаты которых будут представлены, мы полагали N = 9000 и T = 0. Полное число ячеек 2D сетки в импульсном пространстве составляло  $201 \times 201$ .

Последовательность перестроек основного состояния системы, происходящих при усилении квазичастичного взаимодействия, представлена на рис. 2. Для понимания характера этих перестроек полезен



Рис. 2. Перестройки ферми-поверхности двумерной системы с квазичастичным взаимодействием (5) при увеличении |g| от 0.8 до 2.0. |g| = 0.8 – ферми-жидкостное состояние с изотропной ферми-поверхностью;  $|g| = 0.9 \div 1.65$  – нематическое состояние  $\mathcal{N}_{xy}$  с двумя осями симмметрии;  $|g| = 1.7 \div 1.85$  – нематическое состояние  $\mathcal{N}_x$  с одной осью симметрии; |g| = 1.9 – изотропное состояние  $\mathcal{T}_3$ , ферми-поверхность трехсвязна; |g| = 2.0 – изотропное состояние  $\mathcal{T}_2$  с двухсвязной ферми-поверхностью

также рис. 3, на котором показана зависимость от |g| энергии основного и всех метастабильных состояний системы, которые существуют при данной константе g. Существование метастабильных состояний мы установили, организовав старт процедуры Монте-Карло со случайного начального квазичастичного распределения, в результате чего система попадала в два (и даже три) различных конечных состояния



Рис. 3. (Цветной онлайн) Энергия на частицу в единицах  $\varepsilon_{\rm F}^0=p_{\rm F}^2/2m$ для различных состояний системы

по завершении большого числа серий ее термодинамической монте-карловской эволюции.

Первая перестройка основного состояния происходит при  $|g| \simeq 0.85$ , когда нарушается условие устойчивости Померанчука в канале с L = 2. Переходом второго рода по константе q возникает нематическое состояние с квадрупольной деформацией. Октупольная деформация вступает в игру при значении  $|g| \simeq 1.2$ , близком, как видно из рис. 1, к значению  $|q_c^{(4)}| \simeq 1.25$ , при котором нарушается условие устойчивости изотропной ферми-поверхности в канале с L = 4. При дальнейшем увеличении абсолютного значения константы д в дело вступают более высокие четные гармоники, определяющие форму фермиповерхностей, показанных на рис. 2 для |g| = 1.4 и 1.65. Все нематические состояния с четными мультипольностями деформации ферми-поверхности, имеющей две оси симметрии, мы будем обозначать  $\mathcal{N}_{xy}$ .

При дальнейшем росте константы связи картина перестроек Ферми-поверхности усложняется. Мы обнаружили, что при |g| = 1.6 наряду с основным состоянием с четной деформацией, существует метастабильное нематическое состояние  $\mathcal{N}_x$ , деформация которого содержит также нечетные мультиполи. Ферми-поверхность этого состояния имеет только одну ось симметрии, поэтому не симметрична при инверсии. При  $|g| \simeq 1.7$  это состояние опускается по энергии ниже состояния  $\mathcal{N}_{xy}$  и переходом первого рода становится основным (см. рис. 3 и панель |g| = 1.7 рис. 2). Четно-деформированное состояние  $\mathcal{N}_{xy}$  продолжает существовать как метастабильное до  $|g| \simeq 2.1$ . При  $|g| \simeq 1.8$  с основным состоянием  $\mathcal{N}_x$  и метастабильным состоянием  $\mathcal{N}_{xy}$  сосуществует третье, лежащее по энергии выше обоих — изотропное состояние  $\mathcal{T}_3$  с трехсвязной ферми-поверхностью. Оно опускается по энергии ниже состояния  $\mathcal{N}_x$  и становится основным при  $|g| \simeq 1.9$  (см. рис. 3 и соответствующую панель рис. 2). Таким образом, при  $|g| \simeq 1.9$  фазовым переходом первого рода по константе g вращательная симметрия основного состояния восстанавливается, но меняется его топология. Состояние  $\mathcal{N}_x$  остается метастабильным до  $|g| \simeq 2.0$ . При этом же значении |g| топология изотропного основного состояния непрерывным переходом меняется – ферми-поверхность становится двухсвязной. Новое основное состояние  $\mathcal{T}_2$  при |g| = 2.0 показано на нижней правой панели рис. 2.

Важной характеристикой основного состояния системы является плотность одночастичных состояний

$$\nu = \int \delta(\varepsilon(\mathbf{p}) - \mu) V dv.$$
 (12)

Мы находили ее, вычисляя число квазичастичных состояний **p** в энергетическом интервале  $|\varepsilon(\mathbf{p}) - \mu| < 0.1 \varepsilon_{\rm F}^0$ . Поведение плотности состояний  $\nu$  показано на рис. 4. Как видно, фазовый переход первого



Рис. 4. (Цветной онлайн) Плотность состояний на единицу объема для основного состояния системы

рода между нематическими состояниями  $\mathcal{N}_{xy}$  и  $\mathcal{N}_x$ и топологический фазовый переход первого рода из нематического  $\mathcal{N}_x$ -состояния в изотропное состояние  $\mathcal{T}_3$  проявляются как скачки в плотности состояний величиной порядка 10 % и 50 % соответственно.

4. Перейдем к анализу неустойчивости фермижидкостного распределения квазичастиц в модели (5) с g > 0 и малыми  $q_0 < p_{\rm F}$ . В этой модели топологическая неустойчивость обусловлена особенностями спектра не на ферми-поверхности, а на окружности радиусом  $p_b < p_{\rm F}$ . Дело в том, что при  $p = p_b$  в уравнении  $\varepsilon(\mathbf{p}) = \mu$  возникает бифуркация – появляются два новых корня, а в импульсном распределении возникает кольцевая дырочная полость. Это легко понять на примере трехмерной модели со взаимодействием

$$f(\mathbf{q}) = \frac{2\pi^2 p_{\rm F}^2}{mq_0} g\delta(q^2 - q_0^2), \quad g > 0.$$
(13)

В этом случае интегрирование в уравнении (3) с ферми-жидкостным распределением  $n_{\rm FL}(\mathbf{p})$  выполняется аналитически и дает

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} + \frac{p_{\rm F}^2}{2m} g \Big( \theta(p_{\rm F} - q_0 - p) + \frac{1}{4q_0 p} (p_{\rm F}^2 - (p - q_0)^2) \times \\ \times \left[ \theta(p_{\rm F} + q_0 - p) - \theta(p_{\rm F} - q_0 - p) \right] \Big).$$
(14)

Найденный спектр имеет  $\Lambda$ -образный излом в точке  $p_b = p_{\rm F} - q_0$ , обеспечивающий в этой точке упомянутую выше бифуркацию.

Возвращаясь к 2D-системе, заметим, что в момент рождения кольцевой полости в импульсном распределении плотность одночастичных состояний расходится из-за обращения в нуль групповой скорости  $d\varepsilon/dp$  в точке  $p_b$  [25], поэтому едва возникшая дырочная полость становится привлекательной для формирования неустойчивости Померанчука. Как возникает эта неустойчивость, можно проследить аналитически для ситуации, когда импульс  $q_0 \simeq 2p_b \sin(\pi/n)$  вписывается *n*-кратно в фермиокружность радиусом  $p_b$ . В этом случае *L*-гармоника взаимодействия (5), вычисленная при  $p = p_1 = p_b$ , дается соотношением

$$f_{L} = \frac{\pi}{m} \frac{4\beta g p_{\rm F}^{2}}{p_{b}^{2} \sin^{2}(\pi/n)} \int_{0}^{2\pi} \frac{\cos L\vartheta}{[\sin^{2}(\vartheta/2)/\sin^{2}(\pi/n) - 1]^{2} + \beta^{2}} \frac{d\vartheta}{2\pi},$$
(15)

в котором множителем 4 учтено, что неустойчивость разыгрывается на двух очень близких взаимодействующих между собой границах дырочной полости.

В пределе очень острого пика при малых значениях  $q_0$ , т.е.  $\beta \ll q_0/p_{\rm F} \sim 1/n \ll 1$ , гармонику можно приближенно вычислить аналитически. Введя в окрестности значения  $\vartheta = 2\pi/n$ , при котором подынтегральное выражение имеет резкий экстремум, переменную  $x = (\vartheta - 2\pi/n)(n/\pi\beta)$ , преобразуем выражение (15) к виду

$$f_L \simeq \frac{8gnp_{\rm F}^2}{mp_b^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos L(2\pi/n + \pi\beta x/n)}{x^2 + 1} \frac{dx}{2\pi}.$$
 (16)

Пренебрегая при L < nслагаемым с $\beta$ в аргументе косинуса, получаем

$$f_L \simeq \frac{4gnp_{\rm F}^2}{mp_b^2} \cos(2\pi L/n). \tag{17}$$

Письма в ЖЭТФ том 106 вып. 11-12 2017

Гармоники  $f_L$  становятся отрицательными при L > n/4, а наибольшее по модулю значение  $f_L$  достигается, когда  $\cos(2\pi L/n) \simeq -1$ , т.е. при  $L \simeq n/2 \simeq \simeq \pi (p_{\rm F}/q_0 - 1)$ . Подстановка (17) в условие устойчивости (6) показывает, что критическое для возникновения этой неустойчивости значение константы связи  $g_c^{(L)} \propto 1/L$  падает с уменьшением  $q_0$ .

Импульсные распределения квазичастиц в основном состоянии системы за точкой неустойчивости для  $\beta = 0.05$  и разных значений  $q_0$ , найденные методом Монте-Карло по описанной выше схеме, показаны на рис. 5. При  $q_0 = p_{\rm F}$  бифуркация локализо-



Рис. 5.  $q_0 = p_{\rm F}$  – деформация ферми-поверхности с мультипольностью L = 3.  $q_0 = 0.5 \, p_{\rm F}$  – мультипольность деформации L = 3, три малых дырочных кармана.  $q_0 = 0.4 \, p_{\rm F} - L = 5$ , пять карманов.  $q_0 = 0.3 \, p_{\rm F} - L = 8$ , восемь карманов.  $q_0 = 0.1 \, p_{\rm F}$  – ферми-поверхность с L = 27 складками.  $q_0 = 0$  – фермионный конденсат

вана в центре ферми-круга, т.е. при  $p_b = 0$ , поэтому основным игроком в формировании неустойчивости Померанчука служит единственная внешняя ферми-поверхность с радиусом  $p_{\rm F}$ . В этом случае импульс q<sub>0</sub> вкладывается в ферми-окружность с кратностью n = 6, поэтому мультипольность деформации ферми-поверхности L = 3. При  $q_0 = 0.5 p_{\rm F}$  бифуркация возникает при  $p_b \simeq 0.5 p_{\rm F}$ . В таком случае вложение  $q_0$  в окружность радиусом  $p_b$  тоже имеет кратность n = 6 и мультипольность L = 3, но деформация внутренних ферми-поверхностей приводит к образованию трех несвязных малых дырочных карманов, т.е. к состоянию, в котором одновременно нарушена вращательная симметрия и изменена топология. Внешняя ферми-поверхность поддерживает C<sub>3</sub> симметрию внутренней перестройки. При  $q_0 = 0.4 p_{\rm F}$ радиус  $p_b \simeq 0.6 p_{\rm F}$ , кратность вложения n = 10, и мультипольность L = 5 отвечает рождению пяти дырочных карманов. При  $q_0 = 0.3 p_F$  кратность n = 16, мультипольность L = 8 и внутри внешней фермиповерхности рождаются восемь дырочных карманов.

Заметим, что состояния с тремя и пятью карманами найдены при заметном превышении константой д критического значения, отвечающего возникновению бифуркации, поэтому дырочные карманы в этих состояниях ощутимо развиты. В состоянии же с мультипольностью L = 8 карманы, показанные на рис. 5, совсем новорожденные. Для всех рассмотренных мультипольностей (не только для L = 8) дырочные карманы рождаются внутри ферми-круга прямо в момент бифуркации. Таким образом, рождение L малых дырочных карманов происходит переходом второго рода, в котором одновременно меняется топология и спонтанно нарушается вращательная симметрия. Отметим, что перестройка фермиповерхности с образованием малых дырочных карманов наблюдается в квантовых осцилляциях термоэдс и коэффициента Нернста в недодопированном купрате  $YBa_2Cu_3O_{\eta}$  [26].

При дальнейшем уменьшении  $q_0$  импульс бифуркации  $p_b$  приближается к  $p_F$ ; кроме того, спектр при  $p \simeq p_F$  становится очень плоским, т.е. плотность состояний на внешней ферми-поверхности в момент бифуркации играет существенную роль. С состоянием, имеющим L дырочных карманов, начинает конкурировать состояние, в котором формируется одна гофрированная ферми-поверхность с L складками. Переход первого рода между этими состояниями происходит в районе  $q_0 = 0.2 p_F$ . При  $q_0 = 0.1 p_F$  число складок равно L = 27, как это можно увидеть из рис. 5.

При  $q_0 \to 0$  кратность вложения  $q_0$  в фермиокружность  $n \to \infty$ , поэтому  $g_c^{(L)} \propto 1/n \to 0$ , т.е. при сколь угодно малой константе g система оказывается неустойчивой относительно спонтанной деформации ферми-поверхности с мультипольностью  $L \to \infty$ . При ненулевой амплитуде деформации  $\delta p_{\rm F}$  и  $q_0 > 0$ , т.е. при конечном значении n, ферми-линия остается линией, поскольку покрывается  $N(\zeta) \propto 1/\zeta$  кругами малым радиусом  $\zeta$ , и ее хаусдорфова размерность

$$\mathcal{D} = \lim_{\zeta \to 0} \frac{\ln N(\zeta)}{\ln(1/\zeta)} \tag{18}$$

остается  $\mathcal{D}_{n<\infty} = 1$ . При  $n \to \infty$  ферми-линия становится бесконечно складчатой и проходит сколь угодно близко к любой точке кольца, ограниченного окружностями с радиусами  $p_{\rm F} \pm \delta p_{\rm F}$ , поэтому число кругов покрытия  $N(\zeta) \propto 1/\zeta^2$  даже при  $\zeta \to 0$ . Из этого следует, что хаусдорфова размерность (18) такой ферми-линии  $\mathcal{D}_{\infty}$  равна *двум*. Переход со сменой размерности ферми-поверхности – топологический переход, происходящий в модели Нозьера, в которую переходит наша модель при  $q_0 \to 0$ , по сценарию фермионной конденсации.

Результат расчета импульсного распределения квазичастиц в этой модели методом Монте-Карло показан на правой нижней панели рис. 5. В темной области все состояния заполнены,  $n(\mathbf{p}) = 1$ ; в светлой – пусты. Диффузное "облако" вокруг заполненного кора – это область фермионного конденсата. В этой области числа заполнения в процессе монтекарловской эволюции флуктуируют между нулем и единицей, так что их средние значения лежат в интервале  $0 < n(\mathbf{p}) < 1$ , а усредненный спектр вырождается, т.е.  $\varepsilon(\mathbf{p}) \equiv \mu$ . Такое определения фермионного конденсата созвучно с его определением [18] как области, где числа заполнения оказываются дробными, а спектр плоским при усреднении их по итерационной эволюции уравнения (3).

В нашей работе перестройка основного состояния ферми-системы изучалась при T = 0. Следует заметить, что влияние температуры на сценарий перестройки весьма существенно. Так, расчеты из работы [27] показали, что при нагревании восстанавливается спонтанно нарушенная С<sub>4</sub> симметрия электронной системы в квадратной решетке, а расчеты в [10, 18] обнаружили при повышении температуры кроссовер от фазы с вращательно симметричными карманами Лифшица в состояние с плоской зоной – фермионным конденсатом. Оценки для рассмотренных здесь двумерных модельных систем указывают, что в них роль температуры также сводится к восстановлению вращательной симметрии и разрушению дырочных карманов с образованием участков с плоским спектром. Подробный анализ этого вопроса будет сделан в отдельной работе.

5. В заключение, на примере сильно коррелированной 2D ферми-системы с модельным взаимодействием квазичастиц  $f(\mathbf{p} - \mathbf{p}')$ , имеющим максимум при  $|\mathbf{p} - \mathbf{p}'| = q_0$ , мы изучили взаимосвязь топологической неустойчивости и неустойчивости Померанчука. В случае  $q_0 = 2p_F$  и отрицательной константы связи, моделирующем квазичастичное взаимодействие в разреженном 2D электронном газе, нематические и топологические фазовые переходы могут равноправно возникать в системе, образуя сложную последовательность перестроек ферми-поверхности. Мы обнаружили две различные нематические фазы  $\mathcal{N}_{xy}$  и  $\mathcal{N}_x$ . В обеих нематических фазах спонтанно нарушена вращательная симметрия, но ферми-линия в фазе  $\mathcal{N}_{xy}$  имеет две оси симметрии и поэтому симметрична относительно инверсии, а в фазе  $\mathcal{N}_x$  ось симметрии только одна и инверсионная симметрия нарушена. Переход из изотропного ферми-жидкостного состояния в состояния  $\mathcal{N}_{xy}$  происходит непрерывным образом при нарушении условия устойчивости Померанчука с ростом константы взаимодействия, тогда как последующий переход из фазы  $\mathcal{N}_{xy}$  в фазу  $\mathcal{N}_x$  происходит скачком. При дальнейшем росте константы связи вращательная симметрия восстанавливается — основное состояние  $\mathcal{N}_x$  топологическим переходом первого рода сменяется изотропным состоянием  $\mathcal{T}_3$  с трехсвязной ферми-линией, которое затем переходит непрерывно в изотропное состояние  $\mathcal{T}_2$ , фермилиния которого двухсвязна.

В случае отталкивания и  $q_0 < p_{\rm F}$  мы исследовали только начальный этап перестройки из фермижидкостного состояния, но даже на этом этапе сценарии перестройки переплетаются весьма причудливо. При  $q_0 \simeq p_{\rm F}$  возникает неустойчивость Померанчука в канале с L = 3, за которой рождается состояние с  $C_3$  симметрией. При  $q_0 < p_{\rm F}$  происходит непрерывный переход, в котором одновременно меняется топология и спонтанно нарушается вращательная симметрия – внутри ферми-кольца в области импульсов  $p_{\rm F}-q_0$  рождаются  $L\simeq \pi (p_{\rm F}/q_0-1)$  малых дырочных карманов и состояние приобретает  $C_L$  симметрию. При  $q_0 \ll p_{\rm F}$  деформированное состояние с ненарушенной топологией оказывается энергетически выгоднее топологически перестроенного состояния, т.е. фазовый переход определяется неустойчивостью Померанчука с мультипольностью  $L \gg 1$ . При  $q_0 \rightarrow 0$ , когда изучаемая модель переходит в двумерную модель Нозьера, мультипольность спонтанной деформации  $L \to \infty$ , ферми-линия становится бесконечно складчатой и приобретает хаусдорфову размерность  $\mathcal{D} = 2$ , что отвечает состоянию с фермионным конденсатом.

Авторы признательны В.А. Ходелю и С.В. Толоконникову за плодотворное обсуждение затронутых в работе вопросов. С.С.П. благодарит INFN, Sezione di Catania, за оказанное гостеприимство во время его пребывания в Катании. Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант # 15-02-06261-а).

- 1. L. D. Landau, Sov. Phys. JETP 3, 920 (1956).
- 2. L. D. Landau, Sov. Phys. JETP 8, 70 (1959).
- 3. I.Ia. Pomeranchuk, Sov. Phys. JETP 8, 361 (1959).

- E. Fradkin, S. A. Kivelson, M. J. Lawler, J. P. Eisenstein, and A. P. Mackenzie, arXiv:0910.4166 (2009).
- 5. H. Fröhlich, Phys. Rev. 79, 845 (1950).
- M. de Llano and J.P. Vary, Phys. Rev. C 19, 1083 (1979).
- M. de Llano, A. Plastino, and J.G. Zabolitsky, Phys. Rev. C 20, 2418 (1979).
- V. C. Aguilera-Navarro, R. Belehrad, M. de Llano, M. Sandel, J. P. Vary, and O. Rojo, Phys. Rev. C 22, 1260 (1980).
- 9. M. V. Zverev and M. Baldo, JETP 87, 1129 (1998).
- M. V. Zverev and M. Baldo, J. Phys.: Condens. Matter 11, 2059 (1999).
- S. A. Artamonov, V. R. Shaginyan, and Yu. G. Pogorelov, JETP Lett. 68, 942 (1998).
- J. Quintanilla and A.J. Schofield, Phys. Rev. B 74, 115126 (2006).
- S.S. Pankartov, M.V. Zverev, and M. Baldo, JETP Lett. 93, 591 (2011).
- S.S. Pankartov and M.V. Zverev, JETP Lett. 97, 163 (2013).
- V. A. Khodel and V. R. Shaginyan, JETP Lett. 51, 553 (1990).
- 16. G.E. Volovik, JETP Lett. 53, 222 (1991).
- 17. P. Nozières, J. Phys. I France 2, 443 (1992).
- V. A. Khodel, J. W. Clark, and M. V. Zverev, Phys. Rev. B 78, 075120 (2008).
- A. A. Abrikosov, L. P. Gor'kov, and I. E. Dzyaloshinski, Methods of Quantum Field Theory in Statistical Physics, Prentice-Hall, London (1963).
- V. V. Borisov and M. V. Zverev, JETP Lett. 81, 503 (2005).
- M. V. Zverev, V. A. Khodel, and S. S. Pankratov, JETP Lett. 96, 192 (2012).
- A. A. Shashkin, S. V. Kravchenko, V. T. Dolgopolov, and T. M. Klapwijk, Phys. Rev. B 66, 073303 (2002).
- V. M. Pudalov, M. E. Gershenson, H. Kojima, N. Butch, E. M. Dizhur, G. Brunthaler, A. Prinz, and G. Bauer, Phys. Rev. Lett. 88, 196404 (2002).
- A. A. Kapustin, A. A. Shashkin, V. T. Dolgopolov, M. Goiran, H. Rakoto, and Z. D. Kvon, Phys. Rev. B 79, 205314 (2009).
- V. A. Khodel, J. W. Clark, and M. V. Zverev, JETP Lett. 94, 73 (2011).
- N. Doiron-Leyraud, S. Badoux, and S. René de Cotret, Nat. Comm. 6, 6034 (2015).
- M. V. Zverev, J. W. Clark, Z. Nussinov, and V. A. Khodel, JETP Lett. 91, 529 (2010).